

## CETOCONAZOL COLÍRIO

### APRESENTAÇÃO

Frasco de polietileno contendo 5mL ou 10mL  
Suspensão estéril oftalmológica  
Via ocular

Concentração usual: 0,3% a 5%

### COMPOSIÇÃO

Cetoconazol  
Veículo qsp (Vaselina sólida, Óleo de milho)

### INDICAÇÃO

O colírio de cetoconazol é um antifúngico indicado para tratamento de infecções fúngicas que acometem os olhos e anexos.

### MECANISMO DE AÇÃO

O cetoconazol é um antifúngico da classe dos imidazóis que atua inibindo a enzima lanosterol 14 $\alpha$ -desmetilase, essencial para a síntese de ergosterol, componente fundamental da membrana celular dos fungos. A inibição dessa via compromete a integridade da membrana, levando à desestabilização celular e, consequentemente, à morte do microrganismo.

### CONTRAINDICAÇÕES

Hipersensibilidade aos componentes da fórmula.

Embora o uso tópico ocular do cetoconazol resulte em baixa absorção sistêmica, essa absorção não pode ser completamente descartada. Considerando seu potencial hepatotóxico, o uso é contraindicado em pacientes imunocomprometidos, com disfunção hepática, gestantes, lactantes e crianças pequenas.

Em casos de lesões corneanas extensas ou epitélio comprometido, o uso do medicamento deve ser avaliado cautelosamente, pois pode haver maior absorção no local comprometido.

### REAÇÕES ADVERSAS

As principais reações adversas associadas ao uso do colírio de cetoconazol são ardência, irritação, lacrimejamento, vermelhidão no local e visão turva temporária.

Reações alérgicas locais são menos comuns, embora possam promover prurido e hiperemia conjuntival.

Caso o medicamento seja absorvido por via sistêmica, reações como náuseas, vômitos, perda de apetite, cólicas abdominais, diarreia, constipação e cefaleia podem ocorrer, embora improváveis no uso oftálmico.

## **POSOLOGIA E MODO DE USAR**

Inclinar levemente a cabeça para trás e puxar a pálpebra inferior para formar uma pequena bolsa.

Pingar a quantidade de gotas no saco conjuntival inferior, conforme orientado pelo médico prescritor, evitando encostar o frasco no olho.

Feche os olhos suavemente e pressione o canto interno do olho (próximo ao nariz) por 1 a 2 minutos para minimizar a absorção sistêmica.

Se for usar outros colírios, aguarde um intervalo de pelo menos 5 a 10 minutos entre as aplicações.

## **CUIDADOS DE ARMAZENAMENTO DO MEDICAMENTO**

Este medicamento deve ser conservado em sua embalagem original, em temperatura ambiente (entre 15 e 30 °C), ao abrigo da luz.

Observar o prazo de uso, que é de 30 dias após a data de fabricação.

**Não use medicamento com o prazo de validade vencido. Para sua segurança, mantenha o medicamento na embalagem original.**

**Todo medicamento deve ser mantido fora do alcance de crianças.**

## **PRECAUÇÕES**

*Se o dispositivo conta-gotas tocar nos dedos, na superfície das pálpebras ou no olho, este frasco deverá ser descartado.*

## **REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS**

- 1 - COUTINHO, D. Terapêutica ocular. Editora Riomed. Rio de Janeiro, 1994.
- 2 - Martindale (The Complete drug reference). Ketoconazole, 32 ed.

## **FABRICANTE**

### **Citopharma Manipulação de Medicamentos Especiais LTDA.**

Rua: Padre Rolim, nº 531 - Bairro: Santa Efigênia – Belo Horizonte / MG.  
Cep: 30.130-090 CNPJ nº 01.640.262/0001-83  
Fone: (31) 3115-6000; Fax: (31) 3115-6002.

Farm. Resp.: Lucas de Melo Gonçalves Pereira - CRF/MG: 41.394

SAC: (31) 3115-6000, opção: 7  
sac@citopharma.com.br