

MINOXIDIL INTRADÉRMICO

APRESENTAÇÃO

Ampola de vidro âmbar de 2mL
Solução injetável e apirogênica

Via INTRADÉRMICA

Uso adulto

Concentração usual: 5mg/mL (0,5%).

COMPOSIÇÃO

Minoxidil sulfato
Veículo qsp (dimetilsulfóxido, água para injetáveis)

INDICAÇÃO

O Minoxidil intradérmico é indicado para o tratamento da alopecia androgenética, alopecia decorrente de doenças e como estimulante do crescimento capilar.

CONTRAINDICAÇÃO

Hipersensibilidade conhecida ao Minoxidil e aos componentes da formulação.

Minoxidil Intradérmico não é recomendado em casos de queda de cabelo acompanhado de lesões ou crostas no couro cabeludo.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS

Caso o Minoxidil seja absorvido por via sistêmica, pode haver um aumento do efeito hipotensor se ele for administrado concomitante a diuréticos ou anti-hipertensivos.

O uso concomitante com outros medicamentos tópicos deve ser evitado, pois pode potencializar a absorção tanto do Minoxidil quanto de outros fármacos.

CUIDADOS DE ARMAZENAMENTO DO MEDICAMENTO

Este medicamento deve ser conservado em sua embalagem original.

O Minoxidil Intradérmico deve ser armazenado à temperatura ambiente (entre 15°C e 30°C) ao abrigo da luz, calor e umidade. Observar o prazo de uso, que é de 06 meses após a data de fabricação.

A solução é incolor, límpida, isenta de partículas visíveis, com odor característico.

Antes de usar, observe o aspecto do medicamento.

Não use medicamento com o prazo de uso vencido.

Todo medicamento deve ser mantido fora do alcance de crianças.

POSOLOGIA

Para tratamento de alopecia androgenética é recomendado a aplicação do Minoxidil Intradérmico na área de interesse, de acordo com critério médico.

REAÇÕES ADVERSAS

Efeitos adversos associados ao Minoxidil Intradérmico são raros, no entanto, os efeitos adversos mais prováveis são relacionados ao uso concomitante com outros medicamentos de aplicação localizada, como por exemplo a tretinoína e antralina, que promoverão maior absorção do Minoxidil e podem resultar em sintomas sistêmicos como palpitações, dores no tórax (do tipo angina), vertigem, debilidade, suor das mãos e pés, inchaço e efeito hipotensor.

Outros eventos que podem ocorrer associado ao uso do Minoxidil Intradérmico é o crescimento não desejado de cabelos, reação alérgica localizada, coceira e perda de cabelo no início do tratamento, sendo que essa queda temporária de cabelo se dá devido a aceleração da troca dos fios , promovida pelo medicamento e em geral ocorre de duas a seis semanas após o início do tratamento, e diminui após algumas semanas.

REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA

1. Uzel BPC, Takano GHS, Chartuni JCN, Cesetti MV, Gavioli CFB, Lemes AM, Costa IMC. Intradermal injections with 0.5% minoxidil for the treatment of female androgenetic alopecia: A randomized, placebo-controlled trial. Dermatol Ther. 2021 Jan;34(1):e14622. doi: 10.1111/dth.14622. Epub 2020 Dec 10. PMID: 33269529.
2. CONTIN, P. A., Alopecia androgenética masculina tratada com microagulhamento isolado e associado a minoxidil injetável pela técnica de microinfusão de medicamentos pela pele. Surg Cosmet Dermatol 2016;8(2):158-61.
3. Suchonwanit P, Thammarucha S, Leerunyakul K. Minoxidil and its use in hair disorders: a review. Drug Des Devel Ther. 2019 Aug 9;13:2777-2786. doi: 10.2147/DDDT.S214907. Erratum in: Drug Des Devel Ther. 2020 Feb 10;14:575. PMID: 31496654; PMCID: PMC6691938.

FABRICANTE

Citopharma Manipulação de Medicamentos Especiais LTDA.

Rua: Padre Rolim, nº 531 - Bairro: Santa Efigênia – Belo Horizonte / MG.
Cep: 30.130-090 CNPJ nº 01.640.262/0001-83
Fone: (31) 3115-6000; Fax: (31) 3115-6002.

Farm. Resp.: Lucas de Melo Gonçalves Pereira - CRF/MG: 41.394

SAC: (31) 3115-6000, opção: 7
sac@citopharma.com.br